

ГРИПП:

СИМПТОМЫ
И ПРОФИЛАКТИКА

Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус

СИМПТОМЫ ГРИППА



ЧТО ДЕЛАТЬ?

САМОЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГРИППЕ НЕДОПУСТИМО!

Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 38 – 39 °С вызовите участкового врача на дом либо бригаду скорой помощи!

КРАЙНЕ ОПАСНО ПЕРЕНОСИТЬ ГРИПП НА НОГАХ! Это может привести к тяжелейшим осложнениям

ЧЕЛОВЕК, ЗАБОЛЕВШИЙ ГРИППОМ, ДОЛЖЕН:

- Остаться дома и соблюдать постельный режим
 - Выполнять все рекомендации лечащего врача
 - При кашле и чихании прикрывать рот и нос платком
 - Своевременно принимать лекарства
 - Пить как можно больше жидкости*
-
- ! По возможности изолировать больного гриппом (в отдельную комнату) от других домочадцев
 - ! Регулярно проветривать помещение, где находится больной
 - ! При уходе за больным гриппом использовать медицинскую маску (марлевую повязку)

* Рекомендуется горячий чай, клюквенный или брусничный морсы, щелочные минеральные воды

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?

Наиболее эффективное средство от гриппа – прививка*

-
- Есть как можно больше продуктов, содержащих витамин C (клюква, брусника, лимон и др.) и блюд с добавлением чеснока и лука
 - Тщательно мыть руки с мылом
 - Регулярно делать влажную уборку в помещении
 - Вести здоровый образ жизни, выспаться, сбалансировано питаться и заниматься физкультурой
 - В случае появления заболеваний гриппом в семье или рабочем коллективе – начать прием противовирусных препаратов для профилактической целью (с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата)
 - Регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь
 - Пользоваться маской в местах скопления людей
 - Реже бывать в местах скопления людей и общественном транспорте
 - Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания (чихают, кашляют)

* Вакцинация показана детям начиная с 6-ти месяцев, людям пресловенного возраста, страдающим хроническими заболеваниями, медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания, транспорта. Прививку лучше делают в октябре-ноябре – за 3-4 недели до инфекции

На основе рекомендаций специалистов Роспотребнадзора